

ANTHOXANTHUM ODORATUM

Vårbrodd

Vårbroddssläktet tillhör gräsfamiljen och i Sverige finns två arter - sydvårbrodd och nordvårbrodd. Sydvårbrodd växer i södra Sverige upp till mellersta delarna av landet och upp längs med norrlandskusten. Nordvårbrodd tar vid från Västerbotten och norr ut samt i fjälltrakterna söderut till Dalarna.

Vårbrodd växer i tuvor på torr till frisk och mager mark, den trivs i sol men klarar av halvsuggigt läge. Tuvorna kan bli upp till 50 cm höga, men på torr eller mager mark är de betydligt lägre. Den har ofta många vegetativa skott, dvs skott utan vippor. Markens pH ska vara åt det sura hållet (<7) men vårbrodd är anpassningsbar och klarar neutrala förhållanden. Den skyr däremot basiska förhållanden och missgynnas av igenväxning och näringstillförsel.

BLOMNING

Vårbrodd blommar tidigt, i Skåne redan i maj och fröna mognar i juni. I stråets topp finns en tät axlik vippa som vid blomning är grönlila och något tillplattade. Vipporna blir 3–5 cm långa och 6–15 mm breda. Senare blir vipporna guldgula och är lätta att känna igen. Bladen är 2–10 cm långa och 2–6 mm breda med små bladöron.

DOFT & SMAK

Vårbrodd är känd för sin goda doft och smak som beskrivs som en blandning mellan smörkola, bittermandel och vanilj. Det är ämnet kumarin som ger den goda doften och vårbrodd kallas ibland för kolagräs just på grund av det.



UTBREDDNING

Sydvårbrodd: Södra Sverige och mellersta Sverige. Längs med norrlandskusten.

Nordvårbrodd: Från Västerbotten och norr ut samt i fjälltrakterna söderut till Dalarna.

VÄRDVÄXT FÖR

Tuvtätelsgräsmal (*Elachista humilis*)

Rakstreckad näbbmal (*Sophronia semicostella*)

Sikelsäckmal (*Coleophora lixella*)



Medfinansieras av
Europeiska unionen



Länsstyrelsen
Skåne



Naturskyddsföreningen
Skåne